

兽用处方药

兽药GMP证书编号: (2022) 兽药GMP证字11010号
兽药生产许可证号: (2022) 兽药生产证字11080号
批准文号: 兽药字110802252



复方磺胺氯达嗪钠粉说明书

兽药名称

通用名称: 复方磺胺氯达嗪钠粉
商品名称: 海宜莱
英文名称: Compound Sulfachlorpyridazine Sodium Powder
汉语拼音: Fufang Huang' an Lüdaqinna Fen

主要成分

磺胺氯达嗪钠、甲氧苄啶

性状

本品为淡黄色粉末。

药理作用

本品对大多数革兰氏阳性菌和阴性菌都有较强抑制作用。对磺胺药敏感的细菌不能利用周围环境中的叶酸, 只能利用对氨基苯甲酸和二氢喋啶, 在细菌二氢叶酸合成酶的作用下合成四氢叶酸, 活化性四氢叶酸在嘌呤、胸腺嘧啶核苷的合成中起了重要的传递一碳基团的作用。磺胺药在结构上类似对氨基苯甲酸, 可与对氨基苯甲酸竞争细菌体内的二氢叶酸合成酶, 阻碍二氢叶酸的合成, 最终影响核酸的合成, 抑制细菌的生长繁殖。磺胺药的作用可被能代谢成对氨基苯甲酸的药物如普鲁卡因、丁卡因所拮抗, 此外脓液以及组织分解产物也可提供细菌生长的必需物质, 与磺胺药产生拮抗作用。甲氧苄啶属于抗菌增效剂, 可以抑制二氢叶酸还原酶活性。二者合用可产生协同作用, 增强抗菌效果。

药物相互作用

- (1) 某些含对氨基苯甲酰基的药物如普鲁卡因、丁卡因等在体内可生成对氨基苯甲酸, 酵母片中含有细菌代谢所需要的对氨基苯甲酸, 可降低本药作用, 因此不宜合用。
- (2) 与噻嗪类或速尿等利尿剂同用, 可加重肾毒性。
- (3) 磺胺类药物通常可以置换以下高蛋白结合率的药物, 如甲氧萘酚、保泰松、噻嗪类利尿药、水杨酸盐、丙磺舒、苯妥因, 虽然这些相互作用临床意义还不清楚, 但必须对被置换的药物的增强作用进行监测。
- (4) 抗菌药与磺胺类药物合用, 可降低其生物利用度。

作用与用途

磺胺类抗菌药。用于畜禽大肠埃希菌和巴氏杆菌感染。

用法和用量

以本品计。内服: 一日量, 每1kg体重, 猪、鸡 32mg;
猪, 连用 5~10 日; 鸡, 连用 3~6 日。

不良反应

主要表现为急性反应如过敏反应, 慢性反应表现为粒细胞减少、血小板减少、肝脏损害、肾脏损害及中枢神经毒性反应。易在尿中沉积, 尤其是在高剂量长时间用药时更易发生。

注意事项

- (1) 产蛋供人食用的鸡, 在产蛋期不得使用。
- (2) 不得作为饲料添加剂长期应用。
- (3) 易在泌尿道中析出结晶, 应给患者大量饮水。大剂量、长期应用时宜同时给予等量的碳酸氢钠。
- (4) 肾功能受损时, 排泄缓慢, 应慎用。
- (5) 可引起肠道菌群失调, 长期用药可引起B族维生素和维生素K的合成和吸收减少, 宜补充相应的维生素。
- (6) 不能用于对磺胺类药物有过敏史的病畜。

休药期

猪 4 日, 鸡 2 日。

规格

1000g: 磺胺氯达嗪钠 625g+甲氧苄啶 125g

包装

100g/袋

贮藏

遮光, 密闭保存。

生产批号

见打码处

生产日期

见打码处

有效期

2年

生产企业

浙江海正动物保健品有限公司
地址: 浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号
电话: 0571-23208916
传真: 0571-23208915
网址: www.hisunah.com

兽用处方药

兽药GMP证书编号：(2022)兽药GMP证字11010号
兽药生产许可证号：(2022)兽药生产证字11080号
批准文号：兽药字110802252



复方磺胺氯达嗪钠粉说明书

兽药名称

通用名称：复方磺胺氯达嗪钠粉
商品名称：海宜莱
英文名称：Compound Sulfachlorpyridazine Sodium Powder
汉语拼音：Fufang Huang'an Lüdaqinna Fen

主要成分

磺胺氯达嗪钠、甲氧苄啶

性 状

本品为淡黄色粉末。

药理作用

本品对大多数革兰氏阳性菌和阴性菌都有较强抑制作用。对磺胺药敏感的细菌不能利用周围环境中的叶酸，只能利用对氨基苯甲酸和二氢喋啶，在细菌二氢叶酸合成酶的作用下合成四氢叶酸，活化性四氢叶酸在嘌呤、胸腺嘧啶核苷的合成中起了重要的传递一碳基团的作用。磺胺药在结构上类似对氨基苯甲酸，可与对氨基苯甲酸竞争细菌体内的二氢叶酸合成酶，阻碍二氢叶酸的合成，最终影响核酸的合成，抑制细菌的生长繁殖。磺胺药的作用可被能代谢成对氨基苯甲酸的药物如普鲁卡因、丁卡因所拮抗，此外脓液以及组织分解产物也可提供细菌生长的必需物质，与磺胺药产生拮抗作用。甲氧苄啶属于抗菌增效剂，可以抑制二氢叶酸还原酶的活性。二者合用可产生协同作用，增强抗菌效果。

药物相互作用

- 某些含对氨基苯甲酰基的药物如普鲁卡因、丁卡因等在体内可生成对氨基苯甲酸，酵母片中含有细菌代谢所需要的对氨基苯甲酸，可降低本药作用，因此不宜合用。
- 与噻嗪类或速尿等利尿剂同用，可加重肾毒性。
- 磺胺类药物通常可以置换以下高蛋白结合率的药物，如甲氧蝶呤、保泰松、噻嗪类利尿药、水杨酸盐、丙磺舒、苯妥因，虽然这些相互作用临床意义还不完全清楚，但必须对被置换的药物的增强作用进行监测。
- 抗酸药与磺胺类药物合用，可降低其生物利用度。

作用与用途

磺胺类抗菌药。用于畜禽大肠埃希菌和巴氏杆菌感染。

用法和用量

以本品计。内服：一日量，每1kg体重，猪、鸡32mg；猪，连用5~10日；鸡，连用3~6日。

不良反应

主要表现为急性反应如过敏反应，慢性反应表现为粒细胞减少、血小板减少、肝脏损害、肾脏损害及中枢神经毒性反应。易在尿中沉积，尤其是在高剂量长时间用药时更易发生。

注意事项

- 产蛋供人食用的鸡，在产蛋期不得使用。
- 不得作为饲料添加剂长期应用。
- 易在泌尿道中析出结晶，应给患畜大量饮水。
- 大剂量、长期应用时宜同时给予等量的碳酸氢钠。
- 肾功能受损时，排泄缓慢，应慎用。
- 可引起肠道菌群失调，长期用药可引起B族维生素和维生素K的合成和吸收减少，宜补充相应的维生素。
- 不能用于对磺胺类药物有过敏史的病畜。

休 药 期

猪4日，鸡2日。

规 格

1000g：磺胺氯达嗪钠625g+甲氧苄啶125g

包 装

1000g/袋

贮 藏

遮光，密闭保存。

生产批号

见打码处

生产日期

见打码处

有 效 期

2年

生产企业

浙江海正动物保健品有限公司
地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号
电话：0571-23208916
传真：0571-23208915
网址：www.hisunah.com