

碱式硝酸铋乳房注入剂(干乳期)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：碱式硝酸铋乳房注入剂(干乳期)

商品名称：海闭安

英文名称：Bismuth Subnitrate Intramammary Infusion (Dry Cow)

汉语拼音：Jianshixiaosuanbi Rufangzhuruji (Ganruqi)

【主要成分】碱式硝酸铋

【性 状】本品为白色至类白色油膏。

【药理作用】乳头封闭剂。碱式硝酸铋本身不具有药理活性。碱式硝酸铋乳房注入剂通过在乳头管形成物理性屏障,阻止新的病原菌进入乳房,从而降低奶牛干乳期乳房炎的发病率。

【适 应 证】单独使用,用于预防洁净奶牛干乳期乳房内新生感染;与抗菌性干乳期乳房注入剂联合使用,用于辅助治疗奶牛干乳期乳房炎。

【用法与用量】奶牛干乳期最后一次挤奶后,清洗消毒乳头,待干燥后,乳管注入,每乳室1支。持续温和地推动活塞直至本品形成糊状后使用。灌注后不可按摩乳房和乳头。与抗菌性干乳期乳房注入剂联合使用时,在灌注本品前乳头需再次清洗消毒,灌注本品后乳头需再次消毒。

【不良反应】灌注本品时若带入乳房炎致病菌可能会导致不良反应。

【注意事项】1. 在使用本品前需对奶牛进行兽医临床诊断,若体细胞数 <200000 细胞/ml 或病原菌阴性,则确定为洁净奶牛。2. 患亚临床型乳房炎的奶牛禁止单独使用本品,可在感染乳区使用合适的抗菌药治疗后使用本品。3. 患临床型乳房炎的奶牛禁止单独使用本品。4. 使用本品的奶牛,最好定期观察干乳期奶牛的乳房炎临床症状。如果封闭区出现临床型乳房炎症状,应在治疗前手工去除本品。5. 因本品不具有抗菌活性,给药时乳头应严格消毒。灌注本品前确保乳头已用消毒剂清洗消毒,且风干。乳头清洗消毒的顺序为先远后近,灌注本品的顺序则相反。6. 使用本品时,注意不要灌注到乳池中,以免影响疗效。7. 灌注本品后,乳头需药浴或喷洒消毒,不可按摩乳头或乳区,让奶牛在畜栏中站立至少30分钟,使乳头管关闭,避免乳头接触地面而挤压乳头。8. 极低温度下,本品可能会出现使用困难,需放置室温或连同外包装水浴后使用。为降低感染风险,单支本品不可直接浸于水中。9. 由于本品在乳房内不被吸收,因此可用于妊娠奶牛,产犊时,封闭剂可能会被牛犊吞咽,本品对牛犊是安全的。10. 泌乳期奶牛禁用。如果意外地用于泌乳期奶牛,可出现体细胞数小幅度(最多2倍)短暂上升,此时手工去净本品,不需要额外的治疗措施。11. 本品仅用于动物。应置于儿童不可触及处。如接触了皮肤,用肥皂和温水清洗。12. 干乳期奶牛进入泌乳期,手工去净本品后,至少手工挤3桶牛奶后再收集新鲜牛奶。

【休 药 期】单独使用时,休药期为0日。与抗菌药联用时,应遵守抗菌药在奶和组织中的休药期。

【规 格】按 $\text{Bi}_5\text{H}_9\text{N}_4\text{O}_{22}$ 计 4g : 2.6g

【包 装】4g/支

【贮 藏】密封保存。

【有 效 期】36个月。

【批准文号】兽药字 110807074

【生产企业】

浙江海正动物保健品有限公司

地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号

电话：0571-23208916

传真：0571-23208915

网址：www.hisunah.com